

ORIENTAÇÕES
CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE COM IODO 123
(40703010)

INDICAÇÕES Este exame é utilizado para avaliar a função tireoideana e investigar doenças como: hipertireoidismo, tireoidites, formações nodulares múltiplos ou único, bário mergulhante; além da avaliação pré-tratamento com radioiodoterapia ambulatorial.

PREPARO Realizar jejum de 6 horas do horário agendado. Evitar remédios que alteram a captação tireoideana. Dieta pobre em iodo nos últimos dez dias. Alguns produtos / medicamentos (sob supervisão de seu médico) são interrompidos:

Contrastes iodados, Cosméticos, Amiodarona - 30 a 60 dias
Hormônios tireoideanos (Puran) - 30 dias
Tapazol, Propiltiuracil, Corticoides - 7 dias

EXAME Imagens da região do pescoço são realizadas após 4 horas da administração oral do medicamento, com o paciente em posição deitado por 20 minutos. Se necessário, podemos realizar imagens de 24 horas.

RISCOS Não é administrado medicamento com iodo. A medicação contém mínima quantidade de radiação, apenas para a realização das imagens.

EXAMES ANTERIORES São importantes para a correlação com a cintilografia, como o USG do pescoço, além dos exames de sangue (TSH, T4L, anticorpos).