ORIENTAÇÕES
CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCARDICA REPOUSO (40701069) E ESTRESSE (ESFORÇO 40701131 / FARMACOLOGICO 40701140)

INDICAÇÕES Este exame é utilizado para avaliar a presença de músculo cardíaco íntegro e a sua função regional, em situação de repouso e após estresse. Pode-se pesquisar as mais variadas doenças, tendo como a principal a doença coronariana obstrutiva.

PREPARO Não precisa de jejum. Evitar exercícios nas ultimas 24 horas do exame. Evitar a ingestão de café, cha mate ou chocolate de 12 a 24 horas. Dieta leve no dia do exame. Comparecer com roupas leves e confortáveis para a realização do teste de estresse (evitar cremes). Alguns remédios são interrompidos sob a supervisão de seu medico para melhor uso da cintilografia (diagnostico / prognostico).

Para a realização da esteira, interromper:
Propranolol,Atenolol,Metroprolol, Bisoprolol, Carvedilol, Nadolol - **3 a 5 dias**
Cardizen, Diltiazem, Verapamil - **2 dias**
Sustrate, Isordil, Isossorbida - **1 dia**

Para a realização do estresse com Dipiridamol:
Propranolol,Atenolol,Metroprolol, Bisoprolol, Carvedilol, Nadolol - **1 dia**
Cardizen, Diltiazem, Verapamil - **1 dia**
Sustrate, Isordil, Isossorbida - **1 dia**

EXAME Imagens do coração são realizadas em duas fases após 30 a 90 minutos da administração venosa do medicamento, com o paciente em posição deitado por 20 minutos por fase. As duas fases podem ser realizadas no mesmo dia ou em dias separados, com duração em média de 4 horas no total.

RISCOS Não é administrado medicamento com iodo. As medicações contem mínima quantidade de radiação, apenas para a realização das imagens.

EXAMES ANTERIORES São importantes para a correlação com a cintilografia, como o ECO, ANTERIORES ECG, Teste Ergometrico ou Cateterismo.

Avenida 22 de Outubro n. 733 – Jardim Santa Helena – CEP: 13.806-050 – Mogi Mirim – SP
Fone: 019-3814.3400 ramal 3513 / 3814.3401 email: nuclear22@syriusmedical.com.br