

ORIENTAÇÕES
CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM IODO 131
COD CBHPM 40703053

INDICAÇÕES Este exame é utilizado para avaliar a presença de tecido tireoideano após cirurgia e / ou metástases a distância de carcinoma de tireoide, além do controle periódico após câncer de tireoide.

PREPARO Precisa de jejum de 6 h no 1º dia do exame. Evitar remédios que alteram a captação do iodo. Dieta pobre em iodo nos últimos dez dias. Alguns produtos / medicamentos (sob supervisão de seu médico) são interrompidos:

Contrastes iodados, Cosméticos, Amiodarona - 30 a 60 dias
Hormônios tireoideanos (Puran) - 30 dias
Tapazol, Propiltiuracil, Corticoides - 7 dias

EXAME Imagens da região do pescoço e de corpo inteiro são realizadas após 48 horas da administração oral do medicamento, com o paciente em posição deitado por 30 a 40 minutos.

RISCOS É administrado medicamento com iodo, em pequena quantidade, similar ao sal de cozinha. A medicação contém mínima quantidade de radiação, apenas para a realização das imagens.

EXAMES ANTERIORES São importantes para a correlação com a cintilografia, como o resultado da biópsia, o USG do pescoço, além dos exames de sangue (TSH, Tireoglobulina e Anticorpos anti-tireoglobulina).